



Estas instrucciones están pensadas para que el procedimiento se desarrolle de la mejor forma posible. Lea íntegramente esta ficha de preparación al menos 5 días antes de la intervención y siga atentamente las instrucciones. Si su colon no está completamente vacío y limpio, el médico puede pasar por alto hallazgos importantes y es probable que deba repetir el procedimiento.




<p>FECHA Y HORA DEL PROCEDIMIENTO:</p> <hr/> <p>La hora A LA QUE DEBE LLEGAR es: _____</p>	<p>PREGUNTAS</p> <p><input type="checkbox"/> McAuley Office 405-749-4247</p> <p><input type="checkbox"/> IBD - McAuley Office 405-752-3900</p> <p><input type="checkbox"/> Edmond Office 405-340-4937</p>	<p>LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Mercy Hospital Admitting 4300 W. Memorial Rd. OKC, OK 73120</p> <p><input type="checkbox"/> Mercy Outpatient Surgery Center - Edmond I-35 North Building, North Entrance 2017 W. I-35 Frontage Rd. Edmond, OK 73013</p>
--	--	---

RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- DEBE venir con una persona mayor de 18 años para que se quede durante el procedimiento y lo lleve a casa. De no hacerlo, el procedimiento no se llevará a cabo.
- Deje de tomar suplementos de hierro y pastillas para adelgazar 5 días antes de la intervención.
- EVITE TODOS LOS FRUTOS SECOS, MAÍZ, PALOMITAS DE MAÍZ, SEMILLAS O CUALQUIER FRUTO QUE TENGA CÁSCARA DURANTE LOS CINCO DÍAS ANTERIORES AL PROCEDIMIENTO.**
- EVITE TOMAR ALEVE, IBUPROFENO Y CUALQUIER OTRO ANTIINFLAMATORIO DURANTE LOS CINCO DÍAS ANTERIORES AL PROCEDIMIENTO. PUEDE TOMAR TYLENOL.**
- Medicamentos:**
 - Tome todos sus medicamentos como de costumbre (incluidos los medicamentos para la tensión arterial) el día anterior y el día de la colonoscopia, excepto en los siguientes casos:
 - Para diabéticos:
 - Si recibe insulina, el día de la colonoscopia tome sólo la mitad de la dosis de la mañana.
 - La mañana de la colonoscopia, no tome pastillas para la diabetes.
 - SI ESTÁ TOMANDO ANTICOAGULANTES COMO PLAVIX, WARFARINA, ELIQUIS, XARELTO, ETC., PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO CONSULTORIO PARA QUE LE INDIQUEMOS CUÁNTO TIEMPO ANTES DEL PROCEDIMIENTO DEBE DEJAR DE TOMARLOS. NO ES NECESARIO QUE DEJE DE TOMAR ASPIRINA EN DOSIS BAJAS (325 MG O MENOS).**

TIEMPO DE PREPARACIÓN INTESTINAL: Consulte las instrucciones detalladas en la siguiente tabla





OSCURAS Y TURBIAS
NO ESTÁ OK



PARDAS Y TURBIAS
NO ESTÁ OK



ANARANJADO OSCURO Y ALGO
TRANSLÚCIDAS
NO ESTÁ OK



ANARANJADO CLARO Y CASI
TOTALMENTE TRANSLÚCIDAS
FALTA POCO



AMARILLAS Y TRANSLÚCIDAS,
COMO ORINA
¡YA ESTÁ LISTO!

Cambios que se esperan en el color de las heces durante la preparación intestinal

Deberá comenzar una dieta de líquidos translúcidos la mañana del: _____

Mantenga la dieta de líquidos translúcidos hasta la hora de **NO INGERIR NADA POR BOCA** que se indica a continuación

¡ABSOLUTAMENTE NADA DE ALIMENTOS SÓLIDOS!
****NADA DE LÁCTEOS** **NADA ROJO NI MORADO****
NADA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

Consulte la siguiente lista de líquidos permitidos:

- Agua, agua con gas, Sprite, 7-up, Ginger Ale, Mountain Dew, Fresca, Club soda
- Bebidas energéticas en polvo o embotelladas: Crystal light, Gatorade, Powerade (NADA ROJO NI MORADO)
- Jugos translúcidos (SIN PULPA): de manzana, uva blanca, limonada
- Helados de agua (popsicles), gelatina, dulces duros - NADA ROJO NI MORADO
- Caldo o consomé translúcidos (de pollo o ternera)
- Café y té (SIN LECHE NI CREMA DE NINGÚN TIPO)

El día anterior al procedimiento: _____

A las 5 p.m. -

a. Llene el recipiente suministrado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Abra 1 frasco de 12 comprimidos y trague cada comprimido con un sorbo de agua cada 2 minutos hasta tragar los 12 comprimidos en media hora. Beba el agua restante en un lapso de 20 minutos.

b. Aproximadamente 1 hora después de ingerir el último comprimido, vuelva a llenar el recipiente suministrado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado), y beba toda la cantidad de agua en 30 minutos.

c. Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda la cantidad en un periodo de 30 minutos. Continúe consumiendo líquidos translúcidos hasta la Dosis 2.

El día del procedimiento: _____

6 horas antes de la hora del procedimiento: Repita los pasos a, b y c anteriores. Asegúrese de tomar todos los comprimidos de SUTAB y el agua necesaria a más tardar 4 horas antes de la colonoscopia.

NO INGIERA NADA POR BOCA A PARTIR DE:
CUATRO HORAS ANTES DE LA HORA DEL PROCEDIMIENTO
(Absolutamente nada por la boca, incluidos goma de mascar, dulces duros, tabaco, agua)